EPIGLU®.
Colle tissulaire
Mode d'emploi Lisez attentivement

Composition :
0,1 g de la solution EPIGLU® contient :
Ethyle-2-Cyanoacrylate 95,45 mg
Polyméthylméthacrylate

Chaque tube contient 3 g d'**EPIGLU®**. Cette quantité est suffisante pour le traitement de 20 plaies, au minimum.

EPIGLU® ne représente pas un terrain nutritif pour les bactéries, mais au contraire il a un effet antibactérien

Indications :
La colle tissulaire est destinée à l'usage externe et dans la cavité buccale. Pour les traitements des entailles fraîches, blessures et plaies postopératoires et pour la guérison ou la protection des lésions après l'éradication des modifications cutanées (le naevus, verrues, modifications cutanées pendant la vieillesse, etc.).
Pour la guérison des plaies après une adaptation soigneuse de ses lèvres, on l'utilise comme compensation des points de suture ou leur stabilisation complémentaire.

Contre-indications
A ne pas utiliser sur plaies infectées et inflammatoires, grandes plaies (écorchures, plaies froissées). A ne pas utiliser pour coller les plaies sur les organes internes, sur la surface cérébrale, sur le système nerveux central et périphérique. Il pourrait entraîner l'endommagement des organes par suite de production de cicatrice suivie par des troubles dans le fonctionnement de ces organes. Son usage sur l'intimât et le média vasculaire est contre-indiqué, il pourrait causer une trombotisation et altération des parois vasculaires. Usage interdit, en cas si le patient est allergique à l'un des composants d'**EPIGLU®**.

Avis de sécurité
Pendant quelques secondes elle colle la peau et aussi les paupières. **Voilà pourquoi il faut éviter tout contact avec l'œil! EPIGLU®** ne doit pas être utilisée sur la bulbe oculaire et ne doit pas contacter la muqueuse, les ligaments et les muscles oculaires.
Seulement pour usage sur les plaies externes et la muqueuse buccale.
Avant toute application, il faut adapter avec soin les lèvres de la plaie.
Les lèvres de la plaie qui se collent devraient être autant que possible sèches.
Il ne faut pas instiller la colle sur la plaie, il faut l'appliquer en couches minces.
La colle ne peut être appliquée que sur les plaies fraîches et propres et qui ne sont pas enflammées.

Ne pas respirer les vapeurs de la colle!

N'appliquez pas **EPIGLU®** autour des mamelons de la femme qui allaite.

Premiers soins en cas de contact de la colle avec l'œil :
Le contact de la colle avec l'œil ou la muqueuse palpébrale provoque une altération massive et mécanique de la cornée. Juste après la contamination, il faut rincer l'œil abondamment et longtemps (15min) avec une solution stérile et physiologique. Si elle n'est plus disponible ou pas assez, on peut utiliser de l'eau potable.
On peut aussi appliquer des huiles stériles et neutres à la qualité médicale. Il est indispensable ensuite de rejoindre immédiatement un ophtalmologue.

Dosage et mode d'utilisation :

AVIS : L'usager d'EPIGLU® doit être un personnel sanitaire qualifié!
1. Faites sortir la colle du congélateur juste avant son utilisation. Elle est prête pour un usage immédiat. Si le congélateur n'est plus disponible, stockez la colle dans un réfrigérateur.

2.1. Dévissez complètement l'embouchure.
2.2. Prenez le tube verticalement, tenez-le par le bord supérieur.
2.3. Ne pas presser le tube (!) et percez le chapeau avec la pointe de l'embouchure.
2.4. Revissez l'embouchure sur le tube.
2.5. Dévissez le chapeau de l'embouchure.
2.6. Découpez 1 mm de la pointe, maintenant vous pouvez doser la colle.
2.7. Après avoir retiré la dose, visez tout de suite le chapeau sur l'embouchure, placez le tube dans l'entaille de l'emballage de façon qu'il se tienne droit, le chapeau vers le haut et mettez ensuite l'emballage dans un congélateur ou dans un réfrigérateur.

3. Vous pouvez appliquer la colle sur la peau, soit directement du tube, soit à l'aide de pipettes fines.
En utilisant les pipettes, procédez ainsi:
Instillez 1 jusqu'à 3 gouttes dans le creux sur la palette. Sucez maintenant la colle vers la pipette, de manière que vous serriez la pipette avec le pouce et l'index, à 1 – 2 cm de la brisure. Immergez la pipette dans la colle et détendez l'étreinte. La colle est sucée vers la pipette. Il est notamment possible de couper la pipette à 1cm après la brisure et ensuite placer l'embouchure sur la pointe.

4. Adaptez les lèvres non saignantes de la plaie et appliquez une couche fine de la colle, de façon qu'une pellicule fine se forme. Vous pouvez fixer les lèvres de la plaie avec de la colle, soit sur plusieurs points, soit directement et d'un seul coup sur toute la plaie. **La colle durcit très vite. Une correction ultérieure des lèvres est impossible!** La colle devrait être appliquée en plusieurs plans fins. Laissez chaque plan durcir pour 2 minutes. Une couche trop épaisse n'est pas recommandée, car elle n'augmente pas la force adhésive de la colle, mais le détachement de la colle de la partie cutanée sainte sara plus rapide.

Veillez à ne pas toucher la plaie avec l'embouchure du tube ou avec la pipette, car elles pourraient se coller. Evitez également de la toucher avec d'autres outils, gaze, etc.

Si la colle, par erreur, contacte la peau saine, elle durcit et se détache par la suite sans causer d'altérations.

5. Après l'application de la colle, le patient ne sent aucune douleur. Du moment où elle durcit, il est possible de couvrir la plaie avec du pansement, pour que le patient n'encombre pas la plaie prématurément. Si on constate, lors d'examen de contrôle, que le plan de colle était insuffisant et se détache de la peau saine, on peut appliquer une nouvelle couche. Epiglu ne représente pas un terrain nutritif pour les bactéries, il a un effet antibactérien sur les bactéries qui se retrouvent sur la surface de la plaie.

6. Après avoir retiré la dose de colle, visez tout de suite le chapeau sur l'embouchure, placez le tube dans l'entaille de l'emballage de façon qu'il se tienne droit, le chapeau vers le haut et mettez ensuite l'emballage dans un congélateur ou dans un réfrigérateur.

Pour enlever la colle de la peau saine, du textile et des surfaces de travail, utilisez le détachant des colles rapides Cyano-Ex.

La schématisation de la procédure du collage des plaies

1. Plaie ouverte



2. Adaptation des lèvres de la plaie
Pour adapter les lèvres de la plaie, poussez-les bord à bord et veuillez pour qu'elles ne se lèvent pas et qu'elles restent dans le même niveau. Il est préférable de les faire étendre.



3. Fixation des lèvres de la plaie
Appliquez la colle sur les lèvres adaptées sur plusieurs points, il est aussi possible de enduire d'un seul coup toute la plaie par une couche faible de colle. ATTENTION : La colle durcit rapidement, une correction ultérieure est impossible.



4. Couverture de la plaie
Après le durcissement de la colle, appliquez une nouvelle couche fine mais plus épaisse que la première, on la laisse aussi durcir. Suivant la nécessité, on peut encore appliquer une autre couche de colle.



Effets secondaires
En cas d'usage non qualifié et application de colle en grande quantité, on risque l'altération du tissu, car pendant la polymérisation de la colle la chaleur forte se développe. La couche épaisse de colle empêche la guérison de la plaie. Rarement il peut provoquer des réactions allergiques. Lors de l'usage parfait la tolérance de la colle est bonne.

Expiration de la colle
La date d'expiration de la colle est mentionnée sur le tube et l'emballage. Ne l'utilisez pas après cette date. N'utilisez pas la colle si elle n'est plus transparente et fluide et forme une fibre. Cette colle a commencé à polymériser. L'adaptation parfaite est impossible.

Stockez la colle dans un congélateur ou dans un réfrigérateur en position verticale sans accès de la lumière.

Qualités :
La forme fluide monomère de la solution agissante Ethyle-2-Cyanoacrytale se transforme, en présence de l'eau ou des liquides tissulaires, en polymère et associe les surfaces ensemble par la colle appliquée.

Ne pas laisser EPIGLU® à la portée des enfants.

Meyer-Haake GmbH, Wehrheim www.meyer-haake.com